

Bay Area Advanced Gastroenterology Care

Ramesh N. Ashwath, MD, FACC

Arthi Sanjeevi, MD

Board Certified in Gastroenterology

1130 Kyle Wood Lane Brandon, FL 33511

10004 N. Dale Mabry Hwy, Suite 101, Tampa, Fl. 33618

Phone: 813-600-5423

Preparación intestinal para colonoscopia de dos días

Deberá comprar lo siguiente para su colonoscopia en cualquier farmacia/supermercado:

- 2 botellas de Miralax 238 gramos
- Cuatro (4) tabletas laxantes de 5 mg de Dulcolax (bisacodilo)

Cinco (5) días antes de su colonoscopia: _____

- Deje de comer verduras crudas, frijoles, maíz, nueces, arroz y semillas. Limite el pan, el salvado, los cereales y la avena.
- Deje de tomar Coumadin, Warfarina, Plavix, Lovenox, Aggranox, vitamina E, aceite de pescado y suplementos de hierro.
- Nota: Si está tomando anticoagulantes, debe obtener autorización previa de su médico para suspenderlos.

Dos días antes de su colonoscopia: _____

- 12:00 pm tome 4 tapas (paquetes) de Miralax diluidas en 32 oz del líquido de su elección.
- A las 6:00 pm tome 4 cápsulas (paquetes) de miralax diluidas en 32 oz del líquido de su elección.

El día antes de su colonoscopia: _____

- Al despertar, comience su DIETA ESTRICTA DE LÍQUIDOS CLAROS. Esto incluye café o té sin leche, jugos de frutas colados sin pulpa como jugo de manzana, jugo de uva blanca, jugo de arándano blanco, limonada, Kool-Aid, Tang, Hi-C y Crystal Light. Refrescos, gelatina natural, paletas heladas, caldo claro o caldo. (Nada rojo o morado)
- A las 12:00 del mediodía: Tome las 4 tabletas de Dulcolax.
- A la 1:00 p. m.: mezcle siete tapas (17 gramos cada una) de Miralax en 32 oz. líquido. Beba la cantidad total durante 1 a 2 horas.
- A las 6:00 p. m.: mezcle siete tapas (17 gramos cada una) de Miralax en 32 oz. líquido. Beba la cantidad total durante 1 a 2 horas.
- Si sus deposiciones no desaparecen al final del día, tome la otra mitad de Miralax como se indicó en los "dos días antes...". Nada de comer ni beber después de medianoche. Sin agua cuatro horas antes.

Medicamentos:

- Puede tomar medicamentos para el corazón, pastillas para la presión arterial y pastillas para la tiroides con un pequeño sorbo de agua antes de las 6 a.m.
- No tome diuréticos, medicamentos para la diabetes ni insulina (lleve los medicamentos para la diabetes con usted al centro)
- DEJE DE FENTERMINA 14 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO
- Si usa Ozempic o un inyectable para bajar de peso equivalente, debe suspenderlo 2 semanas antes del procedimiento; si no puede, coméntelo con su equipo gastrointestinal.
- Se deben suspender los productos de marihuana y tabaco dos semanas antes del procedimiento.

Tiene cita con el siguiente médico:

Dr Ramesh Ashwath

Dr Arthi Sanjeevi

en las siguientes instalaciones:

- Brandon Surgery Center** - 516 Vonderburg Drive, Brandon, FL 33511 (813) 654-7771
Please Pre-register at - www.brandonsurgerycenter.com
- St. Joseph's Hospital** - 6901 S. Simmons Loop, Riverview, FL 33578 (813) 302-8000
- Carrollwood Adventhealth Hospital** -7171 N Dale Mabry Hwy, Tampa FL 33614
- AventHealth Surgery Center Wellswood** -5013 N Armenia Ave, Tampa, FL 33603

Si tiene alguna pregunta sobre su procedimiento, llame a la oficina al: 813-600-5423

***** LAS INSTALACIONES LE LLAMARAN EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO CON LA HORA DE LLEGADA *****

LLAME A LA OFICINA CON AL MENOS 7 DÍAS DE ANTICIPACIÓN PARA EVITAR LA CARGO DE CANCELACIÓN DE \$75 por procedimiento